PREFEITURA RIO | Saúde SUS

PREMATURIDADE

NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO — 2026

A PREMATURIDADE É CONSIDERADA UM DOS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO QUE CONTRIBUEM PARA OS ÓBITOS NO PERÍODO NEONATAL

Segundo a OMS, prematuridade corresponde a todo nascimento com menos de 37 semanas de gestação. Vários fatores contribuem para a morbimortalidade infantil, inclusive a prematuridade, ficando os prematuros suscetíveis a infecções respiratórias e hemorragias cerebrais.



45.028
nascidos vivos (NV)

6.014
nascidos vivos com idade gestacional < 37 semanas
13,4% do total de NV



87,1%
dos NV prematuros com **idade gestacional de 32 a 36 semanas**


2,5%
dos NV prematuros com **anomalia congênita**

46,9%
dos NV prematuros com **baixo peso ao nascer (< 2.500g)**

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS PREMATUROS POR ÁREA DE RESIDÊNCIA

PORCENTAGEM DE PREMATURIDADE

< 10% | 10% a 13% | ≥ 14%



5 PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE DE PREMATUROS

Causas de morte	n.º	%
Transtornos maternos hipertensivos	53	14,3%
Síndrome da angústia respiratória	21	5,7%
Corioamnionite	20	5,4%
Septicemia bacteriana	19	5,1%
Doenças maternas renais e das vias urinárias	17	4,6%

21,9%
dos óbitos de prematuros ocorreram nas **PRIMEIRAS 24 HORAS DE VIDA**

370
óbitos infantis < 1 ano com idade gestacional < 37 semanas

a cada 10 óbitos infantis < 1 ano
7 SÃO PREMATUROS

Fonte: SINASC e SIM — base 06/11/2026 (residentes MRJ) • Dados de janeiro a 06/11/2026. Todos os dados referentes a 2026 são preliminares.
Fonte: Coordenação de Vigilância e Análise de Dados Vitais (CADV/SVS/SUBPAV/SMS-Rio) • Arte: Ascom/SMS-Rio • Atualizado em 10/11/2026